

膵・胆道癌

GEM療法レジメン

A-03

< 7日間隔 3週投与 1週休み >

治療日		第1日目	第2-7日目	第8日目	第9-14日目	第15日目	第16-28日目	第29日目
治療内容								
検査	採血	○		○		○		○
診療	副作用の問診	○		○		○		○
	検査結果	○		○		○		○
治療中止基準 (投与当日)	① 白血球数 2000/ μ L未満 ② 血小板数 7万/ μ L未満	-	-	-	-	-	-	-
点滴	① 生食100mL +デカドロン3.3mg×2A 点滴静注【30分】	○		○		○		○
	② 生食100mL +ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴静注 【30分かけて60分以内】	○		○		○		○
	③生食 50ml 点滴静注【全開で】							
減量基準	2回目以降の投与当日 WBC:2000/mm ³ 未満または NEUT:1500/mm ³ 未満、血小板 数7万/ μ L未満	投与延期 (骨髓機能が回復するまで) 次回投与を 1000mg/m ² から800mg/m ² に減量						
禁忌	胸部へ放射線療法を施行している患者							
	胸部X線写真で明らかに、かつ臨床症状のある間質性肺炎または肺線維症のある患者							
	重症感染症を引き起こしている患者							
	本剤の成分に重篤な過敏症の既往のある患者							
	妊婦または妊娠している可能性のある患者							