

進行・再発乳癌

FEC (75 or 100) 療法レジメン

エピルビシン(ファルモルビシン)+シクロホスファミド+5-FU併用療法

B-05

総コース数：4

< 1コース：21日間隔 >

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6日目	第7~21日目	第22日目
治療内容									
検査	採血	○							○
診療									
治療中止基準	①WBC 3000未満 ②血小板 10万未満 ③発熱・CRP上昇 ④PS 2以上	-	-	-	-	-	-	-	-
点滴	①生食100ml +アロカリス1V +パロノセトロン0.75mg×1V +デキサート3.3mg×3A 点滴静注【30分】	○							○
	②生食50ml +エピルビシン 75or100mg/m2 点滴静注【15分】	○							○
	③エンドキサン500mg/m2 +5%ブドウ糖液100ml 点滴静注【30分】	○							○
	④5-Fu500mg/m2 +生食50ml 点滴静注【15分】	○							○
	⑤生食50ml ルートフラッシュ用	○							○
ポストメ ディケー ション	デカドロン(0.5) 16錠2×朝昼食後		○	○	○				

看護のPoint!!

エピルビシンは血管外漏出すると大変!! 点滴中は漏れてないか確認。

万が一もれていたら一旦中止して先生を呼ぶ

患部を冷やす。クロベタゾールフロピオン酸エステル軟膏(強力なステロイド軟膏)を塗る

エピルビシンの色が汗や尿に出てくることがあるが、心配しなくていいよ。

副作用は脱毛・骨髄抑制・悪心・嘔吐が起こりやすい。

エンドキサンによって生理不順や頭痛が起こることがある。

口内炎、下痢の可能性もある。持参薬にワーファリンがあれば主治医に報告(5-FUとの相互作用あり)

投与時間は、厳密にできなくて、多少前後しても大丈夫