

進行・再発乳癌

AC療法レジメン

ドキシソルビシン+シクロフォスファミド療法

B-07

総コース数:4

< 21日間隔・1コース >

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6日目	第7~21日目	第22日目
治療内容									
検査	採血	○							○
診療									
治療中止基準	①WBC 3000未満 ②血小板 10万未満 ③発熱・CRP上昇 ④PS 2以上	-	-	-	-	-	-	-	-
内服薬	イメンドカプセル	125mg	80mg	80mg				-	125mg
点滴	①生食100ml +アロキシ0.75mg +デキサート3.3mg 3A 点滴静注【30分】	○							○
	②ドキシソルビシン60mg/m2 +生食50ml 点滴静注【15分】	○							○
	③エンドキサン600mg/m2 +5%ブドウ糖液100ml 点滴静注【30分】	○							○
	④生食50ml ルートフラッシュ用	○							
ポストメ ディケー ション	デカドロン(0.5) 16錠2×朝昼食後		○	○	○				

看護のPoint!!

アドリアシンは血管外漏出すると大変!! 点滴中は漏れてないか確認。

万が一もれていたら一旦中止して先生を呼ぶ

患部を冷やす。クロベタゾールフロピオン酸エステル軟膏(強力なステロイド軟膏)を塗る

アドリアシンの色が汗や尿に出てくることがあるが、心配なくていいよ。

副作用は脱毛・骨髄抑制・悪心・嘔吐が起こりやすい。

投与時間は、厳密にできなくて、多少前後しても大丈夫

エンドキサンによって生理不順や頭痛が起こることがある。