

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6日目	第7~21日目	第22日目
治療内容									
検査	採血	○							○
診療									
治療中止基準	①白血球 3000/mm <sup>3</sup> 未満 ②好中球 1500/mm <sup>3</sup> 未満 ③血小板 100000/mm <sup>3</sup> 未満 ④ヘモグロビン 8.0g/dL未満	-	-	-	-	-	-	-	-
点滴	①生食100ml +デキサート3.3mg 2A 点滴静注【30分】	○							○
	②ドセタキセル70mg/m <sup>2</sup> +生理食塩液 250ml 点滴静注【1時間以上】	○							○
	③生食50ml ルートフラッシュ用	○							○

	初回投与量	1段階減量	2段階減量
減量基準	70mg/m <sup>2</sup>	60mg/m <sup>2</sup>	50mg/m <sup>2</sup>
	60mg/m <sup>2</sup>	50mg/m <sup>2</sup>	休薬

**看護のPoint!!**

タキソテールは血管外漏出すると大変!! 点滴中は漏れてないか確認。

万が一もれていたら一旦中止して先生を呼ぶ

患部を冷やす。クロベタゾールフロピオン酸エステル軟膏（強力なステロイド軟膏）を塗る

副作用は、脱毛、骨髄抑制、浮腫が起こりやすい

投与時間は1時間以上かければ大丈夫

投与中に過敏症状が起こることがあるので、投与終了までは、患者の状態を十分に観察すること。

吐き気は少ないので、アロキシはなし。