

乳癌

カドサイラ療法

B-16

<21日間隔 カドサイラ>

治療日		第1日目	第2-5日目	第6-8日目	第9-21日目	第22日目
治療内容						
検査	採血	○		○		○
診療	心機能のモニタリング必要。	○				○
	3ヶ月に1回心エコー。					
治療中止基準	①LVEF ベースラインから $\geq 10\%$ ②症候性うっ血性心不全 ③AST, ALT $> 5 \times$ ULN ④総ビリルビン $> 10 \times$ ILN ⑤血小板 5万未満 ⑥末梢神経障害 Grade3, 4	—	—	—	—	—
点滴	①生食100ml +デキサート3.3mg 2A 点滴静注【30分】	○				○
	②初回 カドサイラ 3.6mg/kg+生食250ml 点滴静注 【初回90分以上 2日目以降30分以上】 フィルター付きルートで	○				○
	③生食50ml ルートフラッシュ用（全開）	○				○

減量基準 AST、ALT $> 5 \times$ ULN 休薬し回復後 1段階減量
 総ビリルビン $> 3 \times$ ULN 休薬し回復後 1段階減量
 Plt < 2.5 万 回復後1段階減量
 末梢神経障害 回復後減量不要

通常投与量	3.6mg/kg
1段階減量	3.0mg/kg
2段階減量	2.4mg/kg
3段階減量	中止

看護のPoint!!

アレルギー反応が、特に初回起こりやすい。投与中と投与後24時間以内は特に注意。
 アレルギー反応＝発熱・悪寒・呼吸困難などの違和感