

治療日		第1日目	第2~7日目	第8日目	第9~14日目	第15日目	第16~21日目	第22日目
治療内容								
検査	採血	○						○
診療	心機能のモニタリング必要。 3ヶ月に1回心エコー。	○						○
治療中止基準	①白血球 3000/mm ³ 未満 ②好中球 1500/mm ³ 未満 ③血小板 100000/mm ³ 未満 ④ヘモグロビン 8.0g/dL未満	-		-		-		-
点滴	①生食100ml +デキサート3.3mg 2A 点滴静注【30分】	○						○
	②ドセタキセル注 75mg/m ² +生理食塩液 250ml 点滴静注【1時間以上】	○						○
	③生食50ml ルートフラッシュ用	○						○
	④（初回） ハーセプチン8mg/kg+生食250ml 点滴静注【90分以上】	初回 ○						
	④（2回目以降） ハーセプチン6mg/kg+生食250ml 点滴静注【2回目以降30分以上】	2回目 以降 (○)						○
⑤生食50ml ルートフラッシュ用（全開）	○						○	

減量基準	初回投与量	1段階減量	2段階減量
		75mg/m ²	60mg/m ²
	60mg/m ²	50mg/m ²	休薬

看護のPoint!!

ドセタキセルは血管外漏出すると大変!! 点滴中は漏れてないか確認。

万が一もれていたら一旦中止して先生を呼ぶ

患部を冷やす。クロベタゾールフロピオン酸エステル軟膏（強力なステロイド軟膏）を塗る

副作用は、脱毛、骨髄抑制、浮腫が起こりやすい

投与時間は1時間以上かければ大丈夫

投与中に過敏症状が起こることがあるので、投与終了までは、患者の状態を十分に観察すること。

吐き気は少ないので、アロキシはなし。

アレルギー反応が、特に初回起こりやすい。投与中と投与後24時間以内は特に注意。

アレルギー反応＝発熱・悪寒・呼吸困難などの違和感

投与時間は90分以上かければ問題ない。2回目以降は初回忍容性良好で30分以上。

初回投与の40%にinfusion reaction発現注意。2回目以降は5%以下。