

進行・再発乳癌

イリノテカン療法レジメン

B-21

< 1コース：7日間隔3~4回 少なくとも2週間休薬

| 治療日 | | 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 第6日目 |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|
| 治療内容 | | | | | | | |
| 検査 | 採血 | ○ | | | | | |
| 診療 | 副作用の問診 | ○ | | | | | |
| | 検査結果 | ○ | | | | | |
| 治療中止基準 | ①WBC 3000未満 ②血小板 10万未満 ③発熱・CRP上昇 ④PS 2以上 | — | — | — | — | — | — |
| 点滴 | ①生食100ml +アロキシ0.75mg +デキサート3.3mg 2A 点滴静注【30分】 | ○ | | | | | |
| | ②イリノテカン塩酸塩点滴静注 (100mg/m ²) +生理食塩液 250ml 点滴静注【90分以上】 | ○ | | | | | |
| | ③生食50ml ルートフラッシュ用 | ○ | | | | | |
| | | | | | | | |

看護のPoint!!

特徴的な副作用は下痢。投与中～直後の早発型と、投与24時間以降の遅発型。ロペミンなどで対処
骨髄抑制と吐き気、脱毛の可能性あり。

イリノテカンは90分以上かければ大丈夫

>

| 第7日目 | 第8日目 |
|------|------|
| | ○ |
| | |
| | |
| - | - |
| | ○ |
| | ○ |
| | ○ |
| | |