

B-23

< 21日間隔：ペルツマブ、トラスツマブ、ドセタキセル（3週毎） >

| 治療日 | | 第1日目 | 第2～7日目 | 第8日目 | 第9～14日目 | 第15～21日目 | 第22日目 |
|--------------------------|---|--------------|--------|------|---------|----------|-------|
| 治療内容 | | | | | | | |
| 検査 | 採血 | ○ | | | | | ○ |
| 診療 | 副作用の問診 | ○ | | | | | ○ |
| | 検査結果 | ○ | | | | | ○ |
| | 心機能のモニタリング必要。 | ○ | | | | | ○ |
| | 3ヶ月に1回心エコー。 | ○ | | | | | |
| 治療中止基準 | ①WBC ②好中球 1500未満 ③血小板 10万未満 ④発熱・CRP上昇 ⑤AST又はALTが施設基準値上限の1.5倍、ALPが施設基準値上限の2.5倍を超える場合 | | — | — | — | — | |
| プレメディケーション | — | | — | — | — | — | |
| 点滴 | ①生食50ml ルートキープ用 | ○ | | ○ | | | ○ |
| | ②（初回） パージェタ 840mg + 生食250ml 点滴静注【60分以上】 | 初回 ○ | | | | | |
| | ②（2回目以降） パージェタ 420mg + 生食250ml 点滴静注【2回目以降30分以上】 | 2回目以降 （○） | | | | | ○ |
| | ③生食50ml ルートフラッシュ用 （15分以上かけて） | ○ | | | | | ○ |
| | ④（初回） ハーセプチン8mg/kg + 生食250ml 点滴静注【90分以上】 | 初回 ○ | | | | | |
| | ④（2回目以降） ハーセプチン6mg/kg + 生食250ml 点滴静注【2回目以降30分以上】 | 2回目以降 （○） | | | | | ○ |
| | ⑤生食50ml ルートフラッシュ用 | ○ | | | | | ○ |
| | ⑥ 生理食塩液 50ml + ハラヴェン（1.4mg/m ² ） 点滴静注【2～5分】 | ○ | | ○ | | | ○ |
| ⑦生食50ml ルートフラッシュ用（全開） | ○ | | ○ | | | ○ | |

看護のPoint!!

投与中に過敏症状が起こることがあるので、投与終了までは、患者の状態を十分に観察すること。

アレルギー反応が、特に初回起こりやすい。投与中と投与後24時間以内は特に注意。

アレルギー反応＝発熱・悪寒・呼吸困難などの違和感

初回投与の40%にinfusion reaction発現注意。2回目以降は5%以下。