

HER2陽性乳癌

ペルツマブ + トラスツマブ 皮下注レジメン

B-27

<21日間隔：皮下注（ペルツマブ + トラスツマブ）（3週毎）>

治療日		第1日目	第2～7日目	第8日目	第9～14日目	第15～21日目	第22日目
治療内容							
検査	採血	○					○
診療	副作用の問診	○					○
	検査結果	○					○
	心機能のモニタリング必要。	○					○
	3ヶ月に1回心エコー。	○					
治療中止基準	①LVEF<50%でベースラインより10%以上低下が見られる場合	—	—		—	—	—
プレメディケーション	—	—	—		—	—	—
投与	①（初回） （6週以上間隔が空いたとき） フェスゴIN（15mL） 皮下注【8分以上】	初回 ○					
	①（2回目以降） フェスゴMA（10mL） 皮下注【5分以上】	2回目以降 （○）					○

看護のPoint!!

投与部位、投与方法注意!! 大腿部に皮下注

投与は緩徐に!! 目安は30秒に1mL以下のペースで

投与中に過敏症状が起こることがあるので、投与終了までは、患者の状態を十分に観察すること。

アレルギー反応が、特に初回起こりやすい。投与中と投与後24時間以内は特に注意。

アレルギー反応＝発熱・悪寒・呼吸困難などの違和感

初回投与の40%にinfusion reaction発現注意。2回目以降は5%以下。

初回投与の40%にinfusion reaction発現注意。2回目以降は5%以下。