

治療日		第1日目	第2~7日目	第8日目	第9~14日目	第15日目	第16~28日目	第29日目
治療内容								
検査	採血	○		○				○
診療	副作用問診	○		○				○
	心機能モニタリング (3ヶ月に1回心エコー)	○						
治療中止基準	①WBC 3000未満 ②血小板 10万未満 ③発熱・CRP上昇 ④PS 2以上	—	—	—	—	—	—	—
内服薬	エンドキサン錠(100mg/m ² /day) 体表面積1.5m ² 未満は100mg(分2) 1.5m ² 以上は150mg(分3)	↓	↓	↓	↓	(↓) ※day1夕より開始した 場合はday15朝/昼まで	休	↓
点滴	①生食50ml ルートキープ用	↓						↓
	②初回 生食250ml+トラスツズマブ 8mg/kg 点滴静注【初回90分以上】	↓						
	②2回目以降 生食250ml+トラスツズマブ 6mg/kg 点滴静注【2回目以降30分以上】							↓
	③(①')生食100ml +アロカリス 1V +パロノセトロン 1V +デキサート3.3mg 2A 点滴静注【30分】	↓		↓				↓
	④(②')生食100ml +メソトレキセート(40mg/m ²) 点滴静注【30分】	↓		↓				↓
	⑤(③')生食50ml +5-FU(600mg/m ²) 点滴静注【5分】	↓		↓				↓
	⑥(④')生食50ml ルートフラッシュ用	↓		↓				↓

治療延期基準：day1での白血球数2500/mm³未満で治療延期。Day8での白血球数2500/mm³未満でそのコースのday8~14の薬剤投与中止。2週間以上の投与延期でエンドキサンの投与量を20%減量を検討する。Grade3以上の副作用で治療延期を考慮。

看護のPoint!!

ひどくはないが、血管外漏出がないことを確認する。

脱毛、骨髄抑制起こりやすい

エンドキサン錠の服用期間と休薬期間に注意。

アレルギー反応が、特に初回起こりやすい。投与中と投与後24時間以内は特に注意。