

# 進行/再発 大腸癌 FOLFIRI+アバスタブ療法レジメン インフューザーポンプ用

進行/再発 大腸癌 FOLFIRI+avastin療法

C-06-2

< 14日間隔 >

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6日目	第7~14 日目	第15日目
治療内容									
検査	採血	○							○
診療	副作用の問診	○							○
	検査結果	○							○
治療中止 基準	①WBC 3000/μl未満 ②血小板 10万/μl未満 ③発熱・CRP上昇 ④PS 2以上	-	-	-	-	-	-	-	-
点滴	①生食100ml +アロキシ0.75mg×1瓶 +デキサート3.3mg×2A 点滴静注【30分】	↓							↓
	②生食100ml アバスチン5mg/kg 点滴静注 【初回90分】【2回目60分】 【3回目以降30分】	↓							↓
	③5%ブドウ糖250mL レボホリナート(200mg/ m <sup>2</sup> ) 点滴静注【2時間】③'と同時に	↓							↓
	③' 5%ブドウ糖250mL イリノテカン塩酸塩点滴静 注(150mg/m <sup>2</sup> ) 点滴静注【90分】③と同時に	↓							↓
	④生食50mL 5-FU(400mg/m <sup>2</sup> ) 点滴静注【全開】	↓							↓
⑤生食250ml 5-FU(2400mg/m <sup>2</sup> ) 計230mlに調製し infuser pump(LV5)で 【46時間】	↓							↓	

## 看護のPoint!!

口内炎、下痢の可能性もある。持参薬にワーマリンがあれば主治医に報告(5-FUとの相互作用あり)

特徴的な副作用は下痢。投与中~直後の早発型と、投与24時間以降の遅発型。ロペミンなどで対処

骨髄抑制と吐き気、脱毛の可能性あり。

投与時間は多少前後してもいいが、イリノテカンは90分以上かければ大丈夫。アバスチンは投与時間に注意  
インフューザーポンプの使用上の注意は大丈夫?残量の確認方法をチェックしておいてね。