

# SOX療法レジメン

## エルプラット+S-1

C-17

&lt; 21日間隔(1コース)&gt;

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5~14日目	第15日目	第16~21日目	第22日目
治療内容									
検査	採血	○							○
診療	副作用の問診	○							○
	検査結果	○							○
治療中止基準	①好中球1200未満 ②血小板 5万未満 ③AST, ALT100以上 ④Scr1.5以上 ⑤感染を疑う発熱(38℃以上) ⑥下痢・口腔粘膜炎G2以上 ⑦(末梢性感覚ニューロパチーG3以上はS-1単独)								
内服	TS-1初回基準量 1. 25m2未満: 40mg/回 1. 25m2以上1. 5m2未満: 50mg/回 1. 5m2以上: 60mg/回 朝夕食後2× 【14日間投与7日間休薬】	↓ 夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝食後	休	↓ 朝・夕食後
点滴	① 生食100ml +アロキシ0. 75mg +デキサート 3. 3mg×2A 点滴静注【30分】	○							○
	③ 5%ブドウ糖500mL +エルプラット(130mg/m <sup>2</sup> ) 点滴静注【2時間】	○							○
	③生食50ml ルートフラッシュ用(全開)	○							○

### 看護のPoint!!

エルプラットによる過敏症症状に注意。呼吸困難感、かゆみ、発赤、皮疹など。

主治医に報告し、次回からガモファー注とポララミン注の前投与を考慮する。(ガモファー錠と材料ミシ錠でも可能)

エルプラットによって末梢神経障害が起こりやすい。まずは冷たいものの接触を避ける。

末梢からエルプラット投与時、血管痛あるかも。温めてあげたり投与時間をゆっくりしてあげる。

TS-1で口内炎、下痢の可能性もある。持参薬にワーファリンがあれば主治医に報告(TS-1との相互作用あり)