

# 進行/再発 大腸癌

# SOX+ベバシマブ療法レジメン

3週間隔

C-19

| 治療日  |  | 第1日目               | 第2日目               | 第3日目               | 第4日目               | 第5~14日目            | 第15日目 | 第16~21日目 | 第22日目              |
|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|--------------------|
| 治療内容 |  |                    |                    |                    |                    |                    |       |          |                    |
| 検査   | 採血   | ○                  |                    |                    |                    |                    |       |          | ○                  |
| 診療   | 副作用の問診   | ○                  |                    |                    |                    |                    |       |          | ○                  |
|      | 検査結果   | ○                  |                    |                    |                    |                    |       |          | ○                  |
| 中止基準 | ①好中球 1000未満 ②血小板 50000未満 ③感染を伴う発熱(38℃以上) ④血清クレアチン 基準値以上<br>⑤AST/ALT 100以上 ⑥総ビリルビン、口内炎、下痢 G(Grade)2以上<br>⑦その他(非血液学的毒性) G3以上(悪心嘔吐脱毛食欲不振疲労感を除く) |                    |                    |                    |                    |                    |       |          |                    |
| 内服   | TS-1初回基準量<br>1. 25m2未満: 40mg/回<br>1. 25m2以上1. 5m2未満: 50mg/回<br>1. 5m2以上: 60mg/回<br>朝夕食後2×<br>【14日間投与7日間休薬】                                   | ↓<br>朝・<br>夕食<br>後 | ↓<br>朝・<br>夕食<br>後 | ↓<br>朝・<br>夕食<br>後 | ↓<br>朝・<br>夕食<br>後 | ↓<br>朝・<br>夕食<br>後 | 休     | 休        | ↓<br>朝・<br>夕食<br>後 |
| 点滴   | ① 生食100ml<br>+アロキシ0. 75mg<br>+デキサート 3. 3mg×2A<br>点滴静注【30分】   | ○                  |                    |                    |                    |                    |       |          | ○                  |
|      | ②生食100ml<br>+アバステン(7. 5mg/kg)<br>点滴静注【初回90分, 2回目60分, 以降30分】  | ○                  |                    |                    |                    |                    |       |          | ○                  |
|      | ③5%ブドウ糖500mL<br>+エルフラット(130mg/m <sup>2</sup> )<br>点滴静注【2時間】  | ○                  |                    |                    |                    |                    |       |          | ○                  |
|      | ④生食50ml<br>ルートフラッシュ用(全開)   | ○                  |                    |                    |                    |                    |       |          | ○                  |

## 看護のPoint!!

エルフラットによる過敏症症状に注意。呼吸困難感、かゆみ、発赤、皮疹など。

主治医に報告し、次回からガモファー注とボララミン注の前投与を考慮する。(ガモファー錠とオシロシン錠でも可能)

エルフラットによって末梢神経障害が起こりやすい。まずは冷たいものの接触を避ける。

末梢からエルフラット投与時、血管痛あるかも。温めてあげたり投与時間をゆっくりしてあげる。

TS-1で口内炎、下痢の可能性もある。持参薬にワーファリンがあれば主治医に報告(TS-1との相互作用あり)