

進行/再発 大腸癌

アバシマブ+S-1療法レジメン

切除不能進行・再発結腸・直腸癌

アバシチン+S-1

C-27

<6週間間隔 × PDまで>

治療日		第1日目	第2~14日目	第15日目	第16~28日目	第29日目	第30~42日目	第43日目
治療内容								
検査	採血	○		○		○		○
	尿検査	○		○		○		○
診療	副作用の問診	○		○		○		○
	検査結果	○		○		○		○
治療中止基準	<S-1> ①白血球2000/mm <sup>3</sup> 未満 ②好中球1000/mm <sup>3</sup> 未満 ③血小板 7.5万/mm <sup>3</sup> 未満 ④AST/ALT≥ULN×2.5 ⑤Cre≥ULN ⑥G2以上の非血液毒性	<BEV> ① 出血G2 ② たんぱく尿G2 ③ 高血圧 G2 ④ G3以上の血栓・塞栓症 ⑤ G2以上の白質脳症 ⑥ 消化管穿孔または裂開 ⑦ G3以上のアレルギー						-
内服薬	S-1 初回量 (80mg/m <sup>2</sup> /day) 1回40mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後 【4週間投与し2週間休薬】	↓ 夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝食後		↓ 夕食後
	①生食50mL 点滴静注【全開】	↓		↓		↓		↓
	②生食100mL アバシチン (5mg/kg) 点滴静注 【初回90分, 2回目60分, 以降30分】	↓		↓		↓		↓
③生食50mL 点滴静注【ルートフラッシュ】	↓		↓		↓		↓	

看護のPoint!!

S-1で口内炎、下痢の可能性もある。持参薬にワーマリンがあれば主治医に報告 (S-1との相互作用あり)