

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第7～21 日目	第22日目
治療内容							
検査	採血	○					○
診療	副作用の問診	○					○
	検査結果	○					○
治療中止 基準	①白血球数 4000/mm <sup>3</sup> 未満（好 中球数 2000/mm <sup>3</sup> 未満） ②血小板数 10万/mm <sup>3</sup> 未満 ③ヘモグロビン 8g/dl未満 ④発熱						
点滴	①生理食塩液 100ml +デカドロン 3.3mg 2A 点滴静注【30分】	↓					↓
	②生理食塩液 250ml +タキソテール 70mg/m <sup>2</sup> 点滴静注【1時間】	↓					↓
	③生理食塩液 50ml 点滴静注【ルートフラッシュ用】	↓					↓
内服	プレドニゾロン(5mg/回)	↓↓ (朝・昼)	↓↓ (朝・昼)	↓↓ (朝・昼)	↓↓ (朝・昼)	↓↓ (朝・昼)	↓↓ (朝・昼)

**看護のPoint!!**

タキソテールは血管外漏出すると大変！！点滴中は漏れてないか確認。

万が一もれていたら一旦中止して先生を呼ぶ

患部を冷やす。クロベタゾールフロピオン酸エステル軟膏（強力なステロイド軟膏）を塗る

副作用は、脱毛、骨髄抑制、浮腫が起こりやすい

投与時間は1時間以上かければ大丈夫

投与中に過敏症状が起こることがあるので、投与終了までは、患者の状態を十分に観察すること。

吐き気は少ないので、アロキシはなし。