

尿路上皮癌

CDDP+GEM療法レジメン

尿路上皮癌（GC（GEM+CDDP）療法レジメン

D-05

< 28日間隔・2コース～コース>

day15を投与しなかった場合は、コース間隔を21日に短縮可能

| 治療日 | | 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5～7日目 | 第8日目 | 第9～14日目 | 第15日目 | 第16～21日目 | 第22日目 | 第23～28日目 |
|---------------------|--|------|------|------|------|--------|------|---------|-------|----------|-------|----------|
| 治療内容 | | | | | | | | | | | | |
| 検査 | 採血 | ○ | | | | | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| 診療 | 副作用の問診 | ○ | | | | | | | | | ○ | |
| | 検査結果 | ○ | | | | | | | | | | |
| 治療中止基準 | ①WBC<3000 or Neu.<1500 ②血小板<100000 ③発熱・CRP上昇 ④PS 2以上 ⑤①②③④ +アロカリス235mg +パロノセトロン 0.75mg 1V +デキサート 3.3mg 3A 点滴静注【1時間】 | | ↓ | | | | ○ | | ○ | | ○ | |
| | ①デカドロン注射液3.3mg×2管 +生食 100mL 点滴静注【30分かけて】 | ↓ | | | | | ↓ | | ↓ | | | |
| | ②生理食塩液 100ml +ゲムシタピン 1000mg/m2 点滴静注【30分】 | ↓ | | | | | ↓ | | ↓ | - | - | - |
| | ③KN1号 500ml +硫酸マグネシウム 8ml +アスパラK 1A 点滴静注【1時間】 | | ↓ | | | | | | | | | |
| | ④KN1号 500ml 点滴静注【1時間】 | | ↓ | | | | | | | | | |
| | ⑤マンニトールS 300ml 点滴静注【30分】 | | ↓ | | | | | | | | | |
| | ⑥生理食塩液 500ml +シスプラチン注 80mg/m2 点滴静注【1時間】 | | ↓ | | | | | | | | | |
| | ⑦KN1号 500ml +アスパラK 1A 点滴静注【1時間】 | | ↓ | | | | | | | | | |
| | ⑧KN1号 500ml 点滴静注【1時間】 | | ↓ | | | | | | | | | |
| | ①生理食塩液 100ml +デキサート 3.3mg 2A 点滴静注【30分】 | | | | | | | | | | | |
| 点滴 | ③生理食塩液 50ml 点滴静注【全開】 | ↓ | | | | | ↓ | | ↓ | | | |
| | ①生理食塩液 100ml +デキサート 3.3mg 2A 点滴静注【30分】 | | | | | | | | | | | |
| ポストメ ディケー ション | デカドロン錠(0.5) 16錠 分2 朝昼食後 | | | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | | | | | | |

減量基準

24CCR <50 ml/min の場合はGEM単剤投与で行う

看護のPoint!!

ゲムシタピンは投与中に血管痛を訴えることがある。患部を温めてあげるといいかも。

それでもダメなときは、次回から溶解液を生食から5%ブドウ糖液に変更してもらおう。

主な副作用は骨髄抑制と間質性肺炎、悪心・嘔吐の可能性あり

| |
|-----------|
| 第29日 目 |
| ○ |
| |
| |
| ○ |
| ↓ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ↓ |
| ↓ |
| ↓ |
| |
| |