尿路上皮癌

MEC療法レジメン

午前開始

尿路上皮癌（ MEC （MTX＋EPI＋CDDP） ）療法レジメン

D-07

＜ 28日間隔・ 2コース～ コース＞

治療日 / 治療内容		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6～7日目	第8日目	第9～14日目	第15日目	第16～21日目	第22日目	第23～28日目	第29日目
検査	採血	○						○	△	○	△	○	△	○
	胸写											○		
診療	副作用の問診		○					○		○		○		○
	検査結果	○	○					○		○		○		○
治療中止または延期基準	①白血球数 3500/mm^{3}未満 ②血小板数 10万/mm^{3}未満 ③ヘモグロビン 10g/dl未満 ④発熱		―	―				―	―	―	―	―	―	
点滴（メイン）	①ラクテック 500mL 点滴静注 【約6時間かけて】	↓	↓	↓						↓				↓
	②ソルデム3A 500mL 点滴静注 【約6時間かけて】	↓	↓	↓						↓				↓
	③ラクテック 500mL 点滴静注 【約6時間かけて】	↓	↓							↓				↓
	④ソルデム3A 500mL 点滴静注 【約6時間かけて】	↓	↓							↓				↓
点滴（側管）	①パロノセトロン0.75mg 1V +デカドロン注射液3.3mg×3A +生食100mL 側管より点滴静注 【30分かけて】	↓												↓
	②メイロン7% 20ml ＋ 生食 100mL 側管より点滴静注 【30分かけて】	↓								↓				↓
	③メソトレキセート（30mg/m^2） ＋ 生食 100mL 側管より点滴静注 【30分かけて】	↓								↓				↓
	④ファルモルビシン（50mg/m^2） ＋ 生食 100mL 側管より点滴静注 【30分かけて】	↓												↓
	①ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS 300ml 側管より点滴静注 【1時間で】		↓											
	②アロカリス235mg 1V +デカドロン3.3mg×3A +生食100mL 側管より点滴静注 【30分かけて】		↓											
	③シスプラチン（100mg/m^2） ＋ 生食 500mL 側管より点滴静注 【2時間以上かけて】		↓											
	④ラシックス20mg 2mL 側管より静注		↓											
内服	デカドロン錠（0.5）16錠分2 朝昼食後			↓	↓	↓								