精巣腫瘍（胚細胞腫瘍）　**BEP療法レジメン**　**午前開始**

精巣腫瘍（胚細胞腫瘍）（ BEP （BLM＋ETP＋CDDP） ）療法レジメン

D-08　＜ 21日間隔・ 3コース～ 4コース＞

治療日 / 治療内容		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6日目	第7～8日目	第9日目	第10～15日目	第16日目	第17～20日目	第21日目
検査	採血	○				○		△	○	△	○	△	○
	胸写	○											○
	A-aDo$_2$, Pao$_2$, DLco	○											○
診療	副作用の問診		○	○	○	○			○		○		○
	検査結果	○	○			○			○		○		○
治療中止または延期基準	①白血球数 3500/mm^{3}未満 ②血小板数 10万/mm^{3}未満 ③ヘモグロビン 10g/dl未満 ④発熱		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
点滴	① 生食 50mL ルートキープ用	↓	↓	↓	↓	↓			↓		↓		↓
	②ブレオ（30mg/body） ＋ 生食 100mL 点滴静注 【30分かけて】		↓						↓		↓		
	③ラステット（100mg/m^2） ＋ 生食500mL 点滴静注 【約2時間かけて】	↓	↓	↓	↓	↓							↓
	④アロカリスTV+ハロスセトロン 0.75mg +デキサート注射液3.3mg×3A +生食500mL 点滴静注 【1時間で】	↓											↓
	④生食500mL +デキサート注射液3.3mg×3A 点滴静注 【1時間で】		↓	↓	↓	↓							↓
	⑤マンニットールS 300ml 点滴静注 【1時間で】	↓	↓	↓	↓	↓							↓
	⑥シスプラチン（20mg/m^2） ＋ 生食 500mL 点滴静注 【2時間以上かけて】	↓	↓	↓	↓	↓							↓
	⑦ラシックス20mg 2mL 静注	↓	↓	↓	↓	↓							↓
	⑧ 生食 50mL ルートフラッシュ	↓	↓	↓	↓	↓			↓		↓		↓
内服													