

尿路上皮がん

TGP療法レジメン

尿路上皮がん (PTX+GEM+CDDP) 療法レジメン

D-13

< 28日間隔 >

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6~7日目	第8日目	第9~14日目	第15日目	第16~21日目	第22日目	第23~28日目	第29日目
治療内容														
検査	採血	○						○						○
	胸写													
診療	副作用の問診		○					○						○
	検査結果	○	○					○						○
治療中止 または延期基準	①好中球 1000/mm ³ 未満 ②血小板数 10万/mm ³ 未満 ③ヘモグロビン 9g/dl未満		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
点滴 (メイン)	①ラクテック 500mL 点滴静注 【約6時間かけて】		↓	↓										
	②ソルデム3A 500mL 点滴静注 【約6時間かけて】		↓	↓										
	③ラクテック 500mL 点滴静注 【約6時間かけて】		↓											
	④ソルデム3A 500mL 点滴静注 【約6時間かけて】		↓											
	①デカドロン注射液3.3mg 2A +ファモチジン20mg +ポララミン5mg +生食 100mL 点滴静注【30分】	↓							↓					↓
	②パクリタキセル (80mg/m ²) +生食250ml 点滴静注【1時間】 フィルター付きルートで	↓							↓					↓
	③ゲムシタピン(1000mg/m ²) +生食 100mL 点滴静注【30分かけて】	↓							↓					↓
	④生食 50mL ルートフラッシュ用(全開)	↓							↓					↓
点滴 (側管)	① アロカリス235mg +パロノセトロン0.75mg +デカドロン注射液3.3mg × 3A +生食100mL 側管より点滴静注 【30分かけて】		↓											
	②マンニトールS 300ml 側管より点滴静注 【1時間で】		↓											
	③シスプラチン (50mg/m ²) +生食 500mL 側管より点滴静注 【2時間以上かけて】		↓											
	④ランックス20mg 2mL 側管より静注		↓											
内服	デカドロン錠(0.5)16錠分2朝昼食後			↓	↓	↓								