## 術後 セミノーマ

**CBDCA** 療法レジメン カルボプラチン療法レジメン < 1コース:21日間隔 1~2コース> D-17

| ו דע           |  |              |      | <u> </u> | . 414      | 1   日]   199 | 1 . •       |       | <b>/</b> / |               |
|----------------|--|--------------|------|----------|------------|--------------|-------------|-------|------------|---------------|
| 治療日<br>治療内容    |  | 第1日目         | 第2日目 | 第3日目     | 第4~7<br>日目 | 第8日目         | 第9~14<br>日目 | 第15日目 | 第16~28     | 第29日目         |
| 検査             | 採血   | 0            |      |          |            | $\triangle$  |             | Δ     |            |               |
| 診療             | 副作用の問診   | 0            |      |          |            | $\triangle$  |             | Δ     |            | 0             |
|                | 検査結果 検査  | 0            |      |          |            | $\triangle$  |             | Δ     |            | 0             |
| 治療中<br>止<br>基準 | ①WBC<3000 or Neu.<1500<br>②血小板<100000<br>③発熱・CRP上昇<br>④PS 2以上                      | -            |      |          |            | _            |             |       |            | ı             |
| 点滴             | ①生食100ml<br>+アロカリス235mg 1V<br>+パロノセトロン0.75mg<br>1V<br>+デキサート 3.3mg 1A<br>点滴静注【30分】 | ļ            |      |          |            |              |             |       |            |               |
|                | ②生理食塩液250ml<br>+カルボプラチン AUC=7<br>点滴静注【1時間】   | Ţ            |      |          |            |              |             |       |            |               |
|                | ③ 生理食塩液 50ml<br>点滴静注【全開】   | $\downarrow$ |      |          |            |              |             |       |            | $\rightarrow$ |

看護のPoint!! 主な副作用は骨髄抑制