

尿路上皮癌
切除不能/再発

ペムブロリズマブ療法レジメン（6週毎）

切除不能/再発 尿路上皮癌 ペムブロリズマブ レジメン
D-25 < 42 日間隔・ PDまで >

| 治療日 | | 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4～7日目 | 第8～42日目 | 第43日目 |
|--------|--|------|------|------|--------|---------|-------|
| 治療内容 | | | | | | | |
| 検査 | 採血 | ○ | | | | | ○ |
| | 胸部X線 | ○ | | | | | ○ |
| 診療 | 副作用の問診 | ○ | | | | | ○ |
| | 検査結果 | ○ | | | | | ○ |
| 治療中止基準 | ①G2以上の肺臓炎 ②副腎クリーゼの疑い ③G3以上の皮膚障害・神経障害 ④AST、ALT>5×ULN ⑤T-Bil>1.5×ULN ⑥Cr>1.5×ベースライン ⑦G2以上の下痢 ⑧自己免疫疾患の発症疑い | — | — | — | — | — | — |
| 点滴 | ① 生食 50ml 点滴静注【全開】 | ↓ | | | | | ↓ |
| | ②生理食塩50ml +キイトルーダ 400mg 点滴静注【30分】 フィルター付きルートで | ↓ | | | | | ↓ |
| | ③ 生食 50ml 点滴静注【全開】 | ↓ | | | | | ↓ |

看護のPoint!!

免疫調節薬であるので、免疫関連の副作用が起こる

Infusion reactionに注意

主な副作用は皮膚障害、甲状腺機能低下、下痢、間質性肺炎

下痢の時はステロイドを使用（止痢剤ではない。大腸炎のため）