

エンホルツマブ ベドチン療法

がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌

D-26

< 28日間隔・ PDまで >

治療日		第1日目	第2~7日目	第8日目	第9~14日目	第15日目	第16~28日目	第29日目
治療内容								
検査	採血	○		○		○		○
	胸部X線	○						△
診療	副作用の問診	○		○		○		○
	検査結果	○		○		○		○
治療中止基準	①G3以上の皮膚障害 ②G2以上の角膜障害 ③血糖値250mg/dL以上 ④G2以上の末梢性ニューロパチー ⑤好中球<1000、Hb<8.0 ⑥血小板<7.5万 ⑦G2以上の間質性肺疾患 ⑧G3以上のその他の副作用							
点滴	① 生食 100mL +デキサート 3.3mg 2A 点滴静注【30分】	↓		↓		↓		↓
	②生食50mL +パドセブ 1.25mg/kg (最大125mg) +注射用水20mL(溶解用) 点滴静注【30分】	↓		↓		↓		↓
	③ 生食 50ml 点滴静注【全開】	↓		↓		↓		↓

看護のPoint!!

Infusion reactionに注意

皮膚障害に注意 ※特に①サイクル目での発現が多いためよく観察する

高血糖に注意（臨床試験で死亡例あり）※糖尿病の既往ある方は特に注意。①サイクル目での発現が多い