

精巣腫瘍(胚細胞腫瘍)

TIP療法レジメン

精巣腫瘍(胚細胞腫瘍) TIP療法(PTX+IFM+CDDP) レジメン

D-31

< 21日間隔・最大4コース>

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6~21 日目	第22日目
治療内容								
検査	採血	○						○
診療	副作用の問診	○	○	○	○	○		○
	検査結果	○						○
治療中止または延期基準	①好中球 1000/mm ³ 未満 ②血小板数 10万/mm ³ 未満		—	—	—	—	—	
点滴	①デキサート3.3mg×6A +パロノセトロン0.75mg +ファモチジン20mg +ポララミン5mg +生食 100mL 点滴静注【30分】	↓						↓
	②パクリタキセル(250mg/m ²) +生食500mL 点滴静注【3時間】 フィルター付きルートで	↓						↓
	③生食 50mL ルートフラッシュ用(全開)	↓						↓
	① デキサート3.3mg×2A +アロカリス235mg(day2のみ) +生食100mL 【30分かけて】		↓	↓	↓	↓		
	②ウロミテキサン注400mg×1A +生食50mL 点滴静注【全開】 イホマイド投与開始時(直前)		↓	↓	↓	↓		
	③イホマイド(1.5g/m ²) +生食 500mL 点滴静注【2時間以上かけて】 閉鎖式ルート使用		↓	↓	↓	↓		
	④ソルアセトD 500mL +メイロン7% 20ml×1A 点滴静注【約2時間かけて】		↓	↓	↓	↓		
	⑤ウロミテキサン注400mg×1A +生食50mL 点滴静注【全開】 イホマイド投与開始4時間後		↓	↓	↓	↓		
	⑥ソルアセトD 500mL +メイロン7% 20ml×1A 点滴静注【約2時間かけて】		↓	↓	↓	↓		
	⑦マンニトールS 300ml 点滴静注【1時間で】		↓	↓	↓	↓		
	⑧シスプラチン(25mg/m ²) +生食 500mL 点滴静注【1時間以上かけて】		↓	↓	↓	↓		
	⑨ウロミテキサン注400mg×1A +生食50mL 点滴静注【全開】 イホマイド投与開始8時間後		↓	↓	↓	↓		
	⑩ソルデム3A 500mL +メイロン7% 20ml×1A 点滴静注【約2時間かけて】		↓	↓	↓	↓		