

切除不能/進行食道癌

Low dose FP+RT療法レジメン

低用量 フルオロウラシル+シスプラチン+放射線併用療法レジメン

E-09

<5-FU, CDDP : 5投2休 6週間>

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6~7日目	第8日目
治療内容								
検査	採血	○						○
診療	副作用の問診	○	○	○	○	○	○	○
	検査結果	○						○
治療中止基準	①WBC 3000未満 ②好中球 1500未満 ③血小板 10万未満 ④発熱・CRP上昇 ⑤PS 2以上	-	-	-	-	-	-	-
内服薬								
放射線	平日5回/週	↓	↓	↓	↓	↓		
メインルート	①生理食塩液 50ml 点滴静注【ルート確保用】	↓						↓
	②生理食塩液 500ml +フルオロウラシル注(200mg/m2) 点滴静注【24時間で】	↓	↓	↓	↓	↓		↓
	③生理食塩液 50ml 点滴静注【ルートフラッシュ】					↓		
側管から	①生理食塩水 250ml +シスプラチン注 4mg/m2 点滴静注【90分】 メインと同時に	↓	↓	↓	↓	↓		↓

看護のPoint!!

投与時間はどれも多少前後しても大丈夫

5-FUで口内炎、下痢の可能性もある。持参薬にワーマリンがあれば主治医に報告(5-FUとの相互作用あり)