

E-10

総コース数

< 42 日間隔・PDまで >

治療日		第1日目	第2~21日目	第22日目	第23~42日目	第43日目	第44~63日目	第64日目
治療内容								
検査	採血	○				○		
	胸部X線	○				○		
診療	副作用の問診	○				○		
	検査結果	○				○		
治療中止基準	①G2以上の肺臓炎 ②副腎クリーゼの疑い ③G3以上の皮膚障害・神経障害 ④AST、ALT>5×ULN ⑤T-Bil>1.5×ULN ⑥Cr>1.5×ベースライン ⑦G2以上の下痢 ⑧自己免疫疾患の発症疑い	-	-	-	-	-	-	-
点滴	① 生食 50ml 点滴静注【全開】	↓		↓		↓		↓
	② 生理食塩100ml +オプジーボ 360mg 点滴静注【30分】 全量100mLとする フィルター付きルートで	↓		↓		↓		↓
	③生食50ml 点滴静注【30分】	↓				↓		
	④生理食塩水 20ml (生食50 mLの容器で) +ヤーボイ 1mg/kg 点滴静注【30分】 フィルター付きルートで	↓				↓		
	⑥ 生食 50ml 点滴静注【全開】	↓		↓		↓		↓

看護のPoint!!

免疫調節薬であるので、免疫関連の副作用が起こる

Infusion reactionに注意

主な副作用は皮膚障害、甲状腺機能低下、下痢、間質性肺炎

下痢の時はステロイドを使用（止痢剤ではない。大腸炎のため）