

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6日目	第7-21日目	第22日目
治療内容									
検査	採血	○							○
診療									
治療中止基準	①白血球 3000/mm ³ 未満 ②好中球 1500/mm ³ 未満 ③血小板 100000/mm ³ 未満 ④ヘモグロビン 8.0g/dL未満	-	-	-	-	-	-	-	-
点滴	①生食100ml +デカドロン3.3mg 2A 点滴静注【30分】	○							○
	②タキソテール60mg/m ² 生理食塩液250ml 点滴静注【1時間以上】	○							○
	③生食50ml ルートフラッシュ用	○							○

減量基準	初回投与量	1段階減量	2段階減量
	60mg/m ²	50mg/m ²	休薬

看護のPoint!!

タキソテールは血管外漏出すると大変!! 点滴中は漏れてないか確認。

万が一もれていたら一旦中止して先生を呼ぶ

患部を冷やす。クロバタソールフロピオン酸エステル軟膏(強力なステロイド軟膏)を塗る

副作用は、脱毛、骨髄抑制、浮腫が起こりやすい

タキソテールの投与時間は1時間以上かければ大丈夫

投与中に過敏症状が起こることがあるので、投与終了までは、患者の状態を十分に観察すること。

吐き気は少ないので、アロキシはなし。