

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6~14日目	第15-21日目	第22日目
治療内容									
検査	採血	○							○
診療									
治療中止基準	①白血球 3000/mm <sup>3</sup> 未満 (好中球 1500/mm <sup>3</sup> 未満) ②血小板 100000/mm <sup>3</sup> 未満 ③発熱・CRP上昇 ④PS2以上	-	-	-	-	-	-	-	-
内服	TS-1・・・80mg/m <sup>2</sup> /day 1日2回朝夕食後 1. 25m <sup>2</sup> 未満：40mg/回×2 1. 25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満：50mg/回×2 1. 5m <sup>2</sup> 以上：60mg/回×2 【14日間投与1週休薬】	↓ 朝・夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝・夕食後	↓ 朝・夕食後	休	↓ 朝・夕食後
点滴	①生食100ml +デカドロン3.3mg 2A 点滴静注【30分】	○							○
	②タキソテール 40mg/m <sup>2</sup> 生理食塩液 250ml 点滴静注【1時間以上】	○							○
	③生食50ml ルートフラッシュ用	○							○

**看護のPoint!!**

タキソテールは血管外漏出すると大変!! 点滴中は漏れてないか確認。

万が一もれていたら一旦中止して先生を呼ぶ

患部を冷やす。クロベタソールプロピオン酸エステル軟膏（強力なステロイド軟膏）を塗る

副作用は、脱毛、骨髄抑制、浮腫が起こりやすい

タキソテールの投与時間は1時間以上かければ大丈夫

吐き気は少ないので、アロキシはなし。

タキソテール投与中に過敏症状が起こることがあるので、投与終了までは、患者の状態を十分に観察すること。

TS-1で口内炎、下痢の可能性もある。持参薬にワーファリンがあれば主治医に報告（TS-1との相互作用あり）