

臨床試験

S-1+ハーセブ° 治療レジメン

3週間レジメン

G-15

< 3週間隔 >

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5~14日目	第15日目	第16~21日目	第22日目
治療内容									
検査	採血	○							○
診療	副作用の問診	○							○
	検査結果	○							○
	心機能のモニタリング必要	○							○
	3ヶ月に1回心エコー								
治療中止基準	①WBC 2000未満 ②好中球 1000未満 ③血小板 7.5万未満 (TS-1単独時の中止基準)		-	-	-	-			-
内服	TS-1初回基準量 1. 25m2未満: 40mg/回 1. 25m2以上1.5m2未満: 50mg/回 1. 5m2以上: 60mg/回 【2週投与1週休薬】	朝・夕 食後	朝・夕 食後	朝・夕 食後	朝・夕 食後	朝・夕 食後	休	休	朝・夕 食後
点滴	①生理食塩液50ml ルートキープ用	↓							↓
	②初回ハーセプチン 8mg/kg +生理食塩液250ml 点滴静注【90分】	(↓)	副作用などの理由で予定していたハーセプチン投与が遅れ、投与予定日より1週間を越えた後に投与する場合は、改めて初回投与量の8mg/kgで投与すること。						
		↓							↓
	③生理食塩液 50ml ルートフラッシュ用(全開)	↓							↓

看護のPoint!!

TS-1で口内炎、下痢の可能性もある。持参薬にワーファリンがあれば主治医に報告 (TS-1との相互作用あり)

TS-1は食後服用したほうが、抗腫瘍効果がある。

アレルギー反応が、特に初回起こりやすい。投与中と投与後24時間以内は特に注意。

アレルギー反応 = 発熱・悪寒・呼吸困難などの違和感