

# 臨床試験 進行・再発胃癌

## S1+ラムシルマブ

G-28

1コース：14日間 ラムシルマブ：隔週

治療日		第1日目	第2～14日目	第15日目	第16～28日目	第29日目	第30～42日目	第43日目
治療内容								
検査	採血	○		○		○		○
	尿検査	△		○		○		○
採血	副作用の問診	○		○		○		○
	検査結果	○		○		○		○
治療中止基準	①G3以上の出血 ②G2の以上の高血圧 ③たんぱく $\geq 2+$ ④その他RAM関連有害事象 $\geq G2$ ⑤好中球 $< 1200$ ⑥血小板 $< 7.5$ 万 ⑦AST $> 100$ ⑧ALT $>$ 男性100 女性69 ⑨Cr $> 1.5$ ⑩総ビリルビン $> 2.0$ ⑪下痢、口腔粘膜炎、手掌・足底発赤知覚不全症候群 $\geq G2$							
内服	TS-1初回基準量 1. 25m <sup>2</sup> 未満：40mg/回 1. 25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満：50mg/回 1. 5m <sup>2</sup> 以上：60mg/回 【4週投与2週休薬】	↓ 夕 食後	↓ 朝・夕 食後	↓ 朝・夕 食後	↓ 朝・夕 食後	↓ 朝 食後	休	↓ 夕 食後
点滴	①生食100ml +ポララミン注5mg 1A 点滴静注【30分】	○		○		○		○
	②サイラムザ注（8mg/kg） 生理食塩液250ml 点滴静注【1時間】 フィルター付きルートで	○		○		○		○
	③生食50ml ルートフラッシュ用（全開）	○		○		○		○

### 看護のPoint!!

アレルギー症状（皮膚異常や顔面紅潮、呼吸困難感など）でたら先生に伝える。  
 だかポララミン注を前投与する。（眠気注意）