

進行・再発胃癌

weekly nabPTXレジメン

G-30

1コース：28日間 nabPTX：7日間隔の3週投与1週休薬

治療日		第1日目	第2~7日目	第8日目	第9~14日目	第15日目	第16~28日目	第29日目
治療内容								
検査	採血	○		○		○		○
診療	副作用の問診	○		○		○		○
	検査結果	○		○		○		○
治療中止基準	クール開始時 (day1) ①好中球数1500未満 ②血小板100000未満 クールの途中 (day8、day15) ①好中球10000未満 ②血小板数75000未満 ③ビリルビン>ULN×1.5 ④AST・ALT 肝転移無し：ULN×3、 肝転移あり：ULN×5							
	注意：インラインフィルターはアブラキサンには使用しない！！ 特定生物由来製品使用同意書が必要です！！							
	①生食100ml +デキサート3.3mg 2A 点滴静注【30分】	○		○		○		○
	④アブラキサン点滴静注用 (100mg/m ²) + 生理食塩液 100ml 点滴静注【30分】	○		○		○		○
	⑤生食50ml ルートフラッシュ用 (全開)	○		○		○		○

減量基準

看護のPoint!!

血管外漏出すると大変！！

→血管外漏出時フローチャートに準じる

長期投与で手足のしびれが起こりやすい。