

# 進行・再発胃癌

# ニボルマブ療法レジメン（4週毎）

切除不能/再発 胃癌 ニボルマブ レジメン

G-34

< 28 日間隔・ PDまで >

| 治療日    |  | 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4～7日目 | 第8～28日目 | 第29日目 |
|--------|--|------|------|------|--------|---------|-------|
| 治療内容   |  |      |      |      |        |         |       |
| 検査     | 採血   | ○    |      |      |        |         | ○     |
|        | 胸部X線   | ○    |      |      |        |         | ○     |
| 診療     | 副作用の問診   | ○    |      |      |        |         | ○     |
|        | 検査結果   | ○    |      |      |        |         | ○     |
| 治療中止基準 | ①G2以上の肺臓炎<br>②副腎クリーゼの疑い<br>③G3以上の皮膚障害・神経障害<br>④AST、ALT>5×ULN<br>⑤T-Bil>1.5×ULN<br>⑥Cr>1.5×ベースライン<br>⑦G2以上の下痢 | —    | —    | —    | —      | —       | —     |
| 点滴     | ① 生食 50ml<br>点滴静注【全開】  | ↓    |      |      |        |         | ↓     |
|        | ②生理食塩100ml<br>+オプジーボ 480mg<br>点滴静注【30分】<br>全量100mlとする。<br>フィルター付きルートで  | ↓    |      |      |        |         | ↓     |
|        | ③ 生食 50ml<br>点滴静注【全開】  | ↓    |      |      |        |         | ↓     |

## 看護のPoint!!

免疫調節薬であるので、免疫関連の副作用が起こる

Infusion reactionに注意

主な副作用は皮膚障害、甲状腺機能低下、下痢、間質性肺炎

下痢の時はステロイドを使用（止痢剤ではない。大腸炎のため）