

ゾルベックス+XELOX療法レジメン

CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行/再発 胃癌

< 21日間隔・PDまで(GLOW試験ではオキサリプラチン最大8回投与)>

G-40

治療日		第0日目	第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6日目	第7~14日目	第15日目	第16~21日目	第22日目
治療内容												
検査	採血		○									○
診療	副作用の問診		○									○
	検査結果		○									○
治療中止基準	①好中球 1500/ μ l未満 ②血小板 10万/ μ l未満 ③Hb 9g/dL未満 ④アルブミン 2.5g/dL未満 ⑤T-bil 正常値上限1.5倍以上 ⑥AST/ALT 正常値上限2.5倍以上 ⑦Cre 30mL/min未満 ⑧PT/INR, PTT 正常値上限1.5倍以上 ⑨PS 2以上	<ゾルベックスの中断・中止基準> ①過敏症/Infusion reaction ・Grade2→中断 (Grade1以下に回復するまで→再開時は減速) ・アラフィラキシー(疑いも含む)/Grade3以上→中止 ②悪心 ・Grade2以上→中断 (Grade1以下に回復するまで→再開時は減速) ③嘔吐 ・Grade2, 3→中断 (Grade1以下に回復するまで→再開時は減速) ・Grade4以上→中止										
内服薬	※糖尿病の既往がない場合 ジブレキササイデス錠2.5mg 1日1回夕食後 1回2錠	↓	↓	↓	↓	↓						↓ (day0~)
	デカドロン錠0.5mg 1日2回朝食後 1回8錠			↓	↓	↓						
	ゼロータ錠2,000mg/ m^2 /日		(夕)	(朝・夕)	(朝・夕)	(朝・夕)	(朝・夕)	(朝・夕)	(朝・夕)	(朝・夕)	休	(夕)
点滴	①生食100mL +アロカリス235mg +パロノセトロン0.75mg +デキサート3.3mg×3A +ポララミン5mg 点滴静注【30分】		↓									↓
	②【初回】ピロイ(800mg/ m^2) +注射用水(5mL/Vで溶解用) +生理食塩液500mL(10倍希釈) 点滴静注 フィルター付きルートで		↓	<投与速度(初回)> 50mL/hで開始、悪心嘔吐なければ30分毎に投与速度を上げる (50→100→150→200mL/hまで) ※希釈後6時間以内(室温)に投与を完了すること								
	②【2回目以降】ピロイ(600mg/ m^2) +注射用水(5mL/Vで溶解用) +生理食塩液500mL(10倍希釈) 点滴静注 フィルター付きルートで			<投与速度(2回目以降)> 37mL/hで開始、悪心嘔吐なければ30分毎に投与速度を上げる (37→75→112→150mL/hまで) ※希釈後6時間以内(室温)に投与を完了すること								↓
	③5%ブドウ糖500mL +オキサリプラチン(130mg/ m^2) 点滴静注【2時間】		↓	※GLOW試験では オキサリプラチン最大8回投与								↓
	④生食50mL ルートフラッシュ用(全開)		↓									↓

☆ゼロータ錠：体表面積にあわせて、朝・夕食後30分以内に1日2回14日間連日経口投与し、7日間休薬

体表面積		1回服用量	減量段階1	減量段階2
1.36m ² 未満		1,200mg (4錠)	900mg (3錠)	600mg (2錠)
1.36m ² 以上1.41m ² 未満		1,500mg (5錠)		
1.41m ² 以上1.51m ² 未満				
1.51m ² 以上1.66m ² 未満		1,800mg (6錠)	1,200mg (4錠)	900mg (3錠)
1.66m ² 以上1.81m ² 未満		1,500mg (5錠)		
1.81m ² 以上1.96m ² 未満				
1.96m ² 以上2.11m ² 未満		2,100mg (7錠)	1,500mg (5錠)	1,200mg (4錠)
2.11m ² 以上				

看護のPoint!!

ピロイ投与開始1時間以内に悪心・嘔吐が多く発現!!

ピロイ投与中に悪心(Grade2以上：制吐剤が必要)、嘔吐(Grade2-3：30分に2回以上の嘔吐)を認めた場合、

Grade1以下に回復するまで中断(約30分を目安)し、1段階減速して投与再開(初速から減速する場合は25mL/h)。

ゼロータで皮膚障害や下痢の可能性もある。持参薬にワーファリンがあれば主治医に報告(ゼロータとの相互作用あり)

オキサリプラチンによる過敏症症状に注意。呼吸困難感、かゆみ、発赤、皮疹など。

オキサリプラチンによって末梢神経障害が起こりやすい。まずは冷たいものの接触を避ける。

末梢からオキサリプラチン投与時、血管痛あるかも。温めてあげたり投与時間をゆっくりしてあげる。