

切除不能/再発

CBDCA+TS-1療法レジメン

切除不能/再発 カルボプラチン+TS-1療法レジメン

LC-16

総コース数

< 21 日間隔・ 1コース～ 6コース >

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6～14日目	第15日目	第16～21日目	第22日目
治療内容										
検査	採血	○								○
診療	副作用の問診	○								○
	検査結果	○								○
治療中止基準	①WBC 3000未満 ②血小板 10万未満 ③発熱・CRP上昇 ④PS 2以上	—	—	—	—	—	—	—		
	TS-1初回基準量 80mg/m ² 分2 14日間 【2週投与1週休薬】	↓ 夕食後	↓ 朝・ 夕食後	↓ 朝・ 夕食後	↓ 朝・ 夕食後	↓ 朝・ 夕食後	↓ 朝・ 夕食後	↓ 朝食後	休	↓ 夕食後
点滴	①生食100ml +アロカリス 235mg 1V +パロノセトロン 1V +デキサート 3.3mg 2A 点滴静注【30分】	↓								↓
	② 生理食塩液250ml +カルボプラチン AUC=5 点滴静注【1時間】	↓								↓
	③生理食塩液 50ml 点滴静注【全開】	↓								↓

* TS-1 (80mg/m²) 2週投与1週休薬。

看護のPoint!!

TS-1で口内炎、下痢の可能性もある。持参薬にワーファリンがあれば主治医に報告 (TS-1との相互作用あり)

TS-1は休薬期間を設けること。

骨髄抑制の副作用に注意。