

## 切除不能/再発

## GEM単剤療法レジメン

切除不能/再発 ゲムシタビン単剤療法レジメン

LC-19 < 1コース：21日間隔・ 7日間隔2週投与1週休薬PDまで >

| 治療日    |   | 第1日目 | 第2~7日目 | 第8日目 | 第10~14日目 | 第15日目 | 第16~21日目 | 第22日目 |
|--------|---|------|--------|------|----------|-------|----------|-------|
| 治療内容   |   |      |        |      |          |       |          |       |
| 検査     | 採血  | ○    |        | ○    |          |       |          | ○     |
| 診療     | 副作用の問診  | ○    |        | ○    |          |       |          | ○     |
|        | 検査結果  | ○    |        | ○    |          |       |          | ○     |
| 治療中止基準 | ①WBC<2000<br>②血小板<70000<br>③発熱・CRP上昇<br>④PS 2以上 |      |        |      |          |       |          |       |
| 点滴     | ①生理食塩液 100ml<br>+デキサート 3.3mg 2A<br>点滴静注【30分】    | ↓    |        | ↓    |          | -     |          | ↓     |
|        | ②生理食塩液 100ml<br>+ゲムシタビン 1000mg/m2<br>点滴静注【30分】  | ↓    |        | ↓    |          | -     |          | ↓     |
|        | ③生理食塩液 50ml<br>点滴静注【全開】                         | ↓    |        | ↓    |          | -     |          | ↓     |

### 看護のPoint!!

ゲムシタビンは投与中に血管痛を訴えることがある。患部を温めてあげるといいかも。

それでもダメなときは、次回から溶解液を生食から5%ブドウ糖液に変更してもらう。

吐き気の頻度は少ないのでアロキシなし。

主な副作用は骨髄抑制と間質性肺炎。

間質性肺炎は怖い副作用。

投与後にかゆみを訴えたらゲムシタビンによるアレルギーかも。

ゲムシタビンは30分以内で投与してね。もし1時間以上かけたら副作用増強!!