

切除不能/再発

DTX単剤療法レジメン

切除不能/再発 ドセタキセル単剤療法レジメン

LC-20

総コース数

<21日間隔・PDまで>

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第7~21日目	第22日目
治療内容							
検査	採血	○					○
診療	副作用の問診	○					○
	検査結果	○					○
治療中止基準	①WBC 3000未満 ②血小板 10万未満 ③発熱・CRP上昇 ④PS 2以上						
点滴	①生理食塩液 100ml +デキサート 3.3mg 2A 点滴静注【30分】	↓					↓
	②生理食塩液 250ml +ドセタキセル 60mg/m ² 点滴静注【1時間】	↓					↓
	③生理食塩液 50ml 点滴静注【全開】	↓					↓

看護のPoint!!

ドセタキセルは血管外漏出すると大変!!点滴中は漏れてないか確認。

万が一もれていたら一旦中止して先生を呼ぶ

患部を冷やす。クロベタソールフロピオン酸エステル軟膏（強力なステロイド軟膏）を塗る

副作用は、脱毛、骨髄抑制、浮腫が起こりやすい

投与時間は1時間以上かければ大丈夫

投与中に過敏症状が起こることがあるので、投与終了までは、患者の状態を十分に観察すること。

吐き気は少ないので、アロキシはなし。