

切除不能/再発

nabPTX療法レジメン

切除不能/再発 非小細胞肺がん アブラキサン療法レジメン

LC-35

総コース数

< 21 日間隔・ 1コース～ >

| 治療日 | | 第1日目 | 第2~7日目 | 第8日目 | 第9~14日目 | 第15日目 | 第16~21日目 | 第22日目 |
|------------------------------|--|------|--------|------|---------|-------|----------|-------|
| 治療内容 | | | | | | | | |
| 検査 | 採血 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 診療 | 副作用の問診 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| | 検査結果 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 注意：インラインフィルターは使用しない！！ | | | | | | | | |
| 特定生物由来製品使用同意書が必要です！！ | | | | | | | | |
| 治療中止基準 | ①Neu. <1500 ②血小板<100000 ③Hb<9.0 ④grade3以上の末梢神経障害 ⑤AST, ALT>2.5×ULN ⑥総ビリルビン>1.5mg/dL ⑦血清クレアチニン>1.5mg/dL ⑧発熱・CRP上昇 ⑨PS 2以上 | | | | | | | |
| | ①生食100ml +デキサート 3.3mg 2A 点滴静注【30分】 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ |
| | ②生理食塩液 100ml +アブラキサン注 100mg/m2 点滴静注【30分】 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ |
| | ③生理食塩液 50ml 点滴静注【全開】 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ |

看護のPoint!!

アブラキサンは血管外漏出すると大変！！

→血管外漏出時フローチャートに準じる

長期投与で手足のしびれが起こりやすい。

アブラキサンは5mg/mLしか入っていない（生食100mlは容器として使用 100mgなら20mL）