

術後 / 切除不能 / 再発

CBDCA+GEM biweekly療法レジメン

i前/術後/再発 非小細胞肺癌 カルボプラチン+ゲムシタビン療法レジメン

LC-37

総コース数

28日間隔・

術後

4コース、進行再発1コース～

| 治療日 | | 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4～14 日目 | 第15日 目 | 第16日 目 | 第17日 目 | 第18～ 28 日目 | 第29日目 |
|------------|--|------|------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------|
| 治療内容 | | | | | | | | | | |
| 検査 | 採血 | ○ | | | | ○ | | | | ○ |
| 診療 | 副作用の問診 | ○ | | | | ○ | | | | ○ |
| | 検査結果 | ○ | | | | ○ | | | | ○ |
| 治療中止 基準 | ①WBC<3000 or Neu.<1500 ②血小板<75000 ③発熱・CRP上昇 | — | | | | | | | | |
| 点滴 | ①生食100ml +アロカリス 1V +パロノセトロン 1V +デキサート 3.3mg 2A 点滴静注【30分】 | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ |
| | ②生理食塩液 100ml +ゲムシタビン 1000mg/m ² 点滴静注【30分】 | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ |
| | ③生理食塩液250ml +カルボプラチン AUC=3 点滴静注【1時間】 | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ |
| | ④ 生理食塩液 50ml 点滴静注【全開】 | ↓ | | | | ↓ | | | | ↓ |

看護のPoint!!

ゲムシタビンは投与中に血管痛を訴えることがある。患部を温めてあげるといいかも。

それでもダメなときは、次回から溶解液を生食から5%ブドウ糖液に変更してもらう。

主な副作用は骨髄抑制と間質性肺炎。

間質性肺炎は怖い副作用。

投与後にかゆみを訴えたらゲムシタビンによるアレルギーかも。

ゲムシタビンは30分以内で投与してね。もし1時間以上かけたら副作用増強!!