

アテゾリズマブ療法レジメン

①切除不能/再発 非小細胞肺癌

②切除不能/再発 小細胞肺癌

③PD-L1陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法

LC-43

1コース21日間隔 ①②：PDまで
③：1年間or16コースまで（短い方）

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4～7日目	第8～21日目	第22日目
治療内容							
検査	採血	○					○
	胸部X線	○					○
診療	副作用の問診	○					○
	検査結果	○					○
治療中止基準	①G2以上の肺臓炎 ②副腎クリーゼの疑い ③G3以上の皮膚障害・神経障害 ④AST、ALT>5×ULN ⑤T-Bil>3×ULN ⑥G2以上の下痢 ⑦甲状腺機能障害の疑い ⑧自己免疫疾患の発症疑い	—	—	—	—	—	—
点滴	① 生食 50ml 点滴静注【全開】	↓					↓
	②生理食塩250ml +テセントリク 1200mg 点滴静注 【初回60分,以降30分】 フィルター付きルートで	↓					↓
	③ 生食 50ml 点滴静注【全開】	↓					↓

看護のPoint!!

免疫調節薬であるので、免疫関連の副作用が起こる

Infusion reactionに注意

主な副作用は皮膚障害、甲状腺機能低下、下痢、間質性肺炎

下痢の時はステロイドを使用（止痢剤ではない。大腸炎のため）

