

切除不能進行腺

GEM+S-1療法レジメン (GEMSAP)

P-02/A-06 <1コース : 4週間> ゲムシタビン : day1, 15投与、TS-1 : 2週間投与2週間休薬

治療日		第1日目	第2-7日目	第8日目	第9-14日目	第15日目	第16~28日	第29日目
治療内容								
検査	採血	○				○		○
診療	副作用の問診	○				○		○
	検査結果	○				○		○
治療中止基準 (投与当日)	① 白血球数 2000/ μ L未満 ② 血小板数 7万/ μ L未満	—	—	—	—	—	—	—
内服薬	TS-1初回量 (80mg/m ² /day) 1日2回朝夕食後 【2週間投与し2週間休薬】	↓ 朝・ 夕食 後	↓ 朝・ 夕食 後	↓ 朝・ 夕食 後	↓ 朝・ 夕食 後	休	休	↓ 朝・ 夕食 後
点滴	① 生理食塩液100mL +デカドロン3.3mg×2A 点滴静注【30分】	○				○		○
	② 生食100mL +ゲムシタビン1000mg/m ² 点滴静注 【30分かけて60分以内】	○				○		○
	③生食 50ml 点滴静注【全開で】	○				○		○
減量基準	2回目以降の投与当日 WBC:2000/mm ³ 未満または NEUT:1500/mm ³ 未満、血小板 数7万/ μ L未満	投与延期 (骨髄機能が回復するまで) 次回投与を 1000mg/m ² から800mg/m ² に減量						
禁忌	胸部へ放射線療法を施行している患者							
	胸部X線写真で明らかに、かつ臨床症状のある間質性肺炎または肺線維症のある患者							
	重症感染症を引き起こしている患者							
	本剤の成分に重篤な過敏症の既往のある患者							
	妊婦または妊娠している可能性のある患者							