

肛門癌(限局性)

5-FU+MMC+放射線療法レジメン

5-FU+マイトマイシン+放射線療法レジメン

a-01

5-FUを1~4日目と29~32日目に投与

マイトマイシンを1日目と29日目に投与（放射線5週間同時併用）

治療日		第1日目	第2日目	第3日目	第4日目	第5日目	第6~28 日目	第29日目
		第29日目	第30日目	第31日目	第32日目	第33日目	第34日目	
治療内容								
検査	採血	○						○
診療	副作用の問診	○	○	○	○			○
	検査結果	○						○
治療中止 基準	①WBC 3000未満 ②血小板 10万未満 ③発熱・CRP上昇 ④PS 2以上	—	—	—	—	—		—
側管から 点滴	①生理食塩液 100ml +アロキシシ 0.75mg 1V +デカドロン 3.3mg 2A 側管から点滴静注【30分】	↓						↓
	②生理食塩水 50ml +マイトマイシン注用(10mg/m ²) +蒸留水100ml(マイトマイシン 溶解用) 側管から点滴静注 【全量50mLにして全開で】	↓						↓
メイン ルート	③生食500mL +5-FU注 1000mg/m ² /日 点滴静注【24時間】 初日マイトマイシン投与後開始	↓	↓	↓	↓			↓
	④生食50ml ルートフラッシュ					↓		

看護のPoint!!

マイトマイシンで、投与中は血管痛や漏れがなくても1ヶ月以上たつて潰瘍形成や投与部位の疼痛を訴えることがある。(原因不明) まずは、投与は確実にを行い、血管外漏出に細心の注意を。

5-FUの4日間持続投与は、末梢からだると3日目くらいから痛くなるかも。主治医と十分に協議するように。

放射線併用の場合、早期から照射部のケアと管理を十分に行うこと。

口内炎、下痢の可能性もある。持参薬にワーマリンがあれば主治医に報告(5-FUとの相互作用あり)