

生化学Ⅰ検査		
検査項目	基準値	単位
総蛋白	6.6～8.1	g/dL
アルブミン	4.1～5.1	g/dL
総ビリルビン	0.4～1.5	mg/dL
直接ビリルビン	0.0～0.4	mg/dL
AST	13～30	U/L
ALT	M: 10～42 F: 7～23	U/L
LD	124～222	U/L
ALP	38～113	U/L
LAP	30～78	U/L
γ-GT	M: 13～64 F: 9～32	U/L
ChE	M: 240～486 F: 201～421	U/L
TC	142～248	mg/dL
中性脂肪	M: 40～234 F: 30～117	mg/dL
HDL-C	M: 38～90 F: 48～103	mg/dL
LDL-C	65～163	mg/dL
CK	M: 59～248 F: 41～153	U/L
CK-MB	25以下	U/L
NH ₃	0～80	μg/dL
UN	8～20	mg/dL
CRE	M: 0.65～1.07 F: 0.46～0.79	mg/dL
尿酸	M: 3.7～7.8 F: 2.6～5.5	mg/dL
血糖	73～109	mg/dL
HbA1c	4.9～6.0	%
Na	138～145	mmol/L
K	3.6～4.8	mmol/L
Cl	101～108	mmol/L
Ca	8.8～10.1	mg/dL
IP	2.7～4.6	mg/dL
Fe	40～188	μg/dL
AMY	44～132	U/L
TIBC	280～355	μg/dL
UIBC	110～280	μg/dL
CRP	0.00～0.14	mg/dL

生化学Ⅱ検査		
検査項目	基準値	単位
PIVKA-II	0～40	mAU/mL
AFP	0～10	ng/mL
CEA	0～5.0	ng/mL
CA-15-3	0～25	U/mL
CA19-9	0～37	U/mL
CA125	0～35	U/mL
SCC	0～2.5	ng/mL
シタ	0～3.5	ng/mL
PSA	0～4.000	ng/mL
フェリチン	M: 50～200 F: 12～60	ng/mL
TSH	0.35～4.94	μIU/mL
F-T3	1.88～3.18	pg/mL
F-T4	0.70～1.48	ng/dL
HCG定量	0～2.7	mIU/mL
HCG定性	陽性：妊娠の可能性あり 陰性：検査実施時における妊娠の可能性は低い	
24時間蛋白量	0.0312～0.120	g/day
ALB/CRE比	0.0～30	mg/g・CRE
KL-6	105～435	U/mL

尿検査	
検査項目	基準値
尿蛋白	-
尿糖	-
尿ケトン体	-
尿潜血	-
尿ウレリノーゲン	±
尿ビリルビン	-
尿白血球反応	-
尿PH	4.5～7.5

※  = 外注

血液検査		
検査項目	基準値	単位
WBC	3.3~8.6	$10^3/\mu\text{L}$
RBC	M4.35~5.55 F3.86~4.92	$10^6/\mu\text{L}$
Hb	M13.7~16.8 F11.6~14.8	g/dL
Ht	M40.7~50.1 F35.1~44.4	%
MCV	83.6~98.2	fL
MCH	27.5~33.2	Pg
MCHC	31.7~35.3	g/dL
PLT	158~348	$10^3/\mu\text{L}$
RDW	11~14	%
NEUT	40~70	%
LYMP	17~49	%
MONO	3~10	%
EOS	0~10	%
BASO	0~2	%

免疫検査		
検査項目	基準値	単位
RPR定性	(-)	
HBs抗原定性	(-)	
HBs抗原定量 (CLEIA)	<0.005	IU/mL
HBs抗体定性	(-)	
HBs抗体定量 (CLEIA)	<10	mIU/mL
HCV抗体	(-)	
HTLV-1抗体 (CLEIA)	(-)	
HIV抗体 (ELISA法)	(-)	
HBc抗体定量 (CLEIA)	<1.0	C.O.I
HBc抗体IgM定量 (CLIA)	<1.0	S/CO
HBe抗原定量 (CLEIA)	<1.0	C.O.I
HBe抗体定量 (CLEIA)	<50	INH%
HA抗体IgM定量 (CLIA)	<0.8	S/CO
抗核抗体	<40	倍
IgA	93~393	mg/dL
IgG	861~1747	mg/dL
IgM	M : 33~183 F : 50~269	mg/dL
C3	73~138	mg/dL
C4	11~31	mg/dL
RF	≤ 15	IU/mL
マイクログロブリン抗体	<40	倍
寒冷凝集反応	<256	倍

凝固検査		
検査項目	基準値	単位
出血時間	1~4.5	分
PT 秒	10~12	SEC
PT %	70~100	%
PT INR	0.90~1.10	INR
APTT 秒	27.0~32.0	SEC
フィブリノーゲン	200~400	mg/dL
ATⅢ	80~130	%
FDP-S	<5	$\mu\text{g/mL}$

※ = 外注